

Dialectical Thinking in the Medical Thesis Collection of QIN Bo-wei

KAN Xiang-ling, WANG Yu-xing

(Tianjin University of TCM, Tianjin 300193, China)

Abstract :After studying the Medical Thesis Collection of QIN Bo-wei carefully his dialectical thinking in the syndrome differentiation was summarized as follows: 1)Put emphasis on whole body , taking eight principles ,qi ,blood and body fluid as the foundation. 2)Pay attention on the pathogenic factor ,creating syndrome differentiation of diseases of the viscera according to fourteen compendiums. 3)Syndrome differentiation of diseases of the viscera is rarely noted and hasn't become a systematic method.

Key words: the Medical Thesis Collection of QIN Bo-wei ;syndrome differentiation of viscera ;dialectical thinking

临床报道

复方沙棘籽油栓联合多功能红外治疗仪治疗宫颈糜烂疗效观察

高卫华

(天津中心妇产科医院 天津 300051)

关键词 :多功能红外治疗仪 ;复方沙棘籽油栓 ;宫颈糜烂

中图分类号 :R711.32

文献标识码 :B

文章编号 :1672-1519(2005)02-0143-01

1 资料与方法

1.1 一般资料 650例患者均来自本院宫颈科门诊,年龄22~53岁,平均33.5岁,均已婚或有性生活史。所有患者均排除妇科急性炎症及滴虫、霉菌性阴道炎及宫颈癌和癌前病变。随机分为观察组(A,330例),复方沙棘籽油栓阴道上药联合采用多功能红外治疗仪治疗;对照组(B,320例),单独使用多功能红外治疗仪治疗。两组一般资料无统计学差异,具有可比性。

分类标准 按全国高等医学院校《妇产科学》分类方法,根据糜烂程度不同分为轻度(I度)、中度(II度)、重度(III度);按糜烂类型分为单纯型、颗粒型、乳突型3类。两组糜烂程度及分型比较,无统计学差异,具有可比性,见表1。

表1 两组对象治疗前宫颈糜烂程度及分型例(%)

组别	n	I度	II度	III度	单纯型	颗粒型	乳突型
A组	330	45 (13.6)	200 (60.6)	85 (25.8)	180 (54.5)	120 (36.4)	30 (9.1)
B组	320	40 (12.5)	210 (65.6)	70 (21.9)	168 (52.5)	122 (38.1)	30 (9.4)

1.2 药品和仪器 复方沙棘籽油栓由陕西海天制药有限公司生产,5粒/盒,2.7g/粒;多功能红外治疗仪由航天机电集团八三五八研究所生产。

1.3 治疗方法 多功能红外治疗仪治疗选择月经干净后3~7d内禁性生活,患者取膀胱截石位,常规消毒后充分暴露宫颈糜烂面,用无菌干棉球擦净宫颈表面分泌物,根据宫颈糜烂程度,调整确定治疗头照射功率,一般输出功率为150W,温度为400℃,将治疗头轻轻伸入阴道窥器内,垂直照射创面,照射时间视病变范围及深度灵活掌握,随时观察创面颜色的变化至改变为灰白色或微黄色即终止照射,一般持续1.5~3s。如遇较大面积的糜烂面,可适当调整窥器,垂直按顺时针方向逐点分区照射,应注意使创面各受光点均匀,防止某点多次重复照射,治疗中注意勿烧伤阴道壁,重度糜烂治疗过程中有出血情况时,可自然产生爆裂,并伴有轻度声响,均

属正常,术毕B组涂以红汞、京万红;A组涂以红汞并于阴道内放置复方沙棘籽油栓1粒,嘱患者以后每晚清洗外阴后自行放入阴道深部1粒至第10d。两组治疗1周内避免重体力劳动,术后2周内阴道有排液及少量流血有味均为正常现象;2个月内禁性生活、坐浴及阴道冲洗,术后2个月复查。

1.4 疗效判断 治愈:宫颈光滑,糜烂消失;显效:糜烂面积缩小>50%,或重度糜烂转为中度、中度糜烂转为轻度,糜烂程度变浅;有效:糜烂面积缩小<50%;无效:糜烂面积无变化。

1.5 统计学方法 两组率的比较采用χ²检验。

2 结果

2.1 治疗效果 两组总有效率比较无显著性差异,见表2。

表2 两组对象治疗效果比较例(%)

组别	n	治愈	显效	有效	无效	总有效率
A组	330	310 (93.9)	20 (6.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	330 (100)
B组	320	295 (92.2)	18 (5.6)	7 (2.2)	0 (0.0)	320 (100)

2.2 阴道排液 两组术后阴道排液持续时间及出血比较有显著性差异(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗后排液持续时间及阴道出血比较例(%)

组别	n	≤7d	8-15d	>15d	阴道出血
A组	330	210(63.6)*	114(34.5)*	6 (1.8*)	3(0.9*)
B组	320	80(25.0)	202(63.1)	38 (11.9)	30(9.4)

注:*与A组比较P<0.05。

3 讨论

复方沙棘籽油栓是一种纯中药制剂,主要成分为沙棘籽油、蛇床子、苦参、乳香、没药等,具有抗菌消炎,提高机体免疫力,祛腐生肌,促进伤口修复及愈合之功效。

本文观察结果显示:复方沙棘籽油栓联合多功能红外治疗仪治疗宫颈糜烂,总有效率与单用多功能红外治疗仪组比较无显著性差异(P>0.05),但联合治疗组阴道排液持续时间、阴道出血与单用多功能红外治疗仪组比较均明显缩短或减少(P<0.05),表明联合治疗可提高治疗效果,值得提倡和推广。

(收稿日期 2005-01-05)

作者简介:高卫华(1959-),女,主治医师,从事中医妇产科临床工作。